

BLOOD SUGAR LEVEL DEPRESSING AGENT**Publication number:** JP58069812**Publication date:** 1983-04-26**Inventor:** HONDA NARIMITSU; NAGAI HIDEAKI; TAKISHIMA
AYAKO; KAWAMURA AKINORI; OBATA NORIKO; DAN
TAKASHI; KOIZUMI MASUO; MURAKAMI YASUSHI;
HINOHARA YOSHIKAZU; NAKANO HIDEKI; TAKAGAKI
YOSHIO**Applicant:** CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD**Classification:****- international:** **C07D213/40; A61K31/16; A61K31/44; A61P3/08;
C07D213/75; C07D213/00; A61K31/16; A61K31/44;
A61P3/00;** (IPC1-7): A61K31/16; A61K31/44;
C07D213/40; C07D213/75**- European:****Application number:** JP19810167934 19811022**Priority number(s):** JP19810167934 19811022**Report a data error here****Abstract of JP58069812**

PURPOSE:To provide a blood sugar level depressing agent containing a compound such as 4-methoxy-N-3-pyridylbenzamide, etc. as an active component, and having excellent blood sugar level depressing effect and long duration of the activity. **CONSTITUTION:**The agent contains the compound of formula[R1 is H or lower alkyl; R2 is straight-chain, branched-chain or cyclic alkyl, (nuclear-substituted) pyridyl, or pyridylmethyl; n is 1-3]as an active component. The active compound of formula can be prepared easily by reacting an amine with a methoxybenzoyl chloride in the presence of a base such as triethylamine by conventional process. It is administered in an arbitrary form prepared by the conventional means for the preparation of ordinary drug preparation.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—69812

⑤ Int. Cl.³

A 61 K 31/16

31/44

// C 07 D 213/40

213/75

識別記号

ADP

庁内整理番号

6408—4C

7138—4C

7138—4C

④ 公開 昭和58年(1983)4月26日

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑤ 血糖降下剤

② 特 願 昭56—167934

② 出 願 昭56(1981)10月22日

⑦ 発 明 者 本多成光

東京都豊島区高田三丁目41番 8

号中外製薬株式会社内

⑦ 発 明 者 永井秀明

東京都豊島区高田三丁目41番 8

号中外製薬株式会社内

⑦ 発 明 者 滝島章子

東京都豊島区高田三丁目41番 8

号中外製薬株式会社内

⑦ 発 明 者 河村明典

東京都豊島区高田三丁目41番 8

号中外製薬株式会社内

⑦ 発 明 者 小島範子

東京都豊島区高田三丁目41番 8

号中外製薬株式会社内

⑦ 発 明 者 段孝

東京都豊島区高田三丁目41番 8

号中外製薬株式会社内

⑩ 出 願 人 中外製薬株式会社

東京都北区浮間5丁目5番1号

④ 代 理 人 安藤憲章

最終頁に続く


明 細 書

1. 発明の名称

血 糖 降 下 剤

2. 特許請求の範囲


一般式



(式中、R₁は水素原子又は低級アルキル基を示し、R₂は直鎖、分岐鎖又は環式アルキル基、核に置換基を有し得るビリジル基又はビリジルメチル基を示し、nは1～3を示す。)で表わされる化合物を有効成分とする血糖降下剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、次の一般式



(式中、R₁は水素原子又は低級アルキル基を示し、R₂は直鎖、分岐鎖又は環式アルキル基、核に置換基を有し得るビリジル基又はビリジルメチル基を示し、nは1～3を示す。)で表わされる化合物を有効成分とする血糖降下剤の発明である。

上式(1)で表わされる化合物の中には、公知の化合物が含まれるが、それらの記載されている先行文献には血糖降下作用ないしそれを示唆する薬理作用は全く記載されていない。

上式(1)で表わされる本発明の化合物は、例えば、以下の参考例に示すように、アミン類とメトキシベンゾイルクロライド類とを、塩基、例えばトリエチルアミンの存在下常法により反応させることにより容易に得ることができる。

参考例.

3-アミノピリジン 9.4 g, トリエチルアミン 15 ml 及びアセトン 200 ml の混合溶液に、氷冷攪拌下、4-メトキシベンゾイルクロライド 17 g を徐々に加える。同温度で 30 分、次いで室温で 1 時間攪拌後反応溶液を 1 L の水に注ぎ、析出する結晶を濾取し、水洗後メタノールから再結晶して無色針状晶の 4-メトキシ-N-3-ピリジルベンズアミド(化合物 1) 17.5 g を得た。収率 77%。融点 168~170℃

元素分析値 分子式 $C_{13}H_{12}N_2O_2$ として

	O	H	N
理論値(%)	68.41	5.30	12.27
実測値(%)	68.33	5.27	12.24

上記と同様にして表 1 の化合物を得た。





























表 1



No	-(OMe) _n	R ₁	R ₂	分子式	融点 (℃)	収率 (%)	元素分析値		
							理論値(%) 実測値(%)	O	H N
2	2-OMe	H		$C_{13}H_{12}N_2O_2$	112~114	76	68.41 68.49	5.30 5.24	12.27 12.31
3	'	'		$C_{14}H_{14}N_2O_2$	80~82	83	69.40 69.32	5.83 5.80	11.56 11.59
4	'	'		$C_{15}H_{16}N_2O_2$	85~87	91	70.29 70.24	6.29 6.23	10.93 10.99
5	3-OMe	'		$C_{13}H_{12}N_2O_2$	121~122	85	68.41 68.48	5.30 5.36	12.27 12.21
6	'	'		'	155~156	83	68.41 68.43	5.30 5.31	12.27 12.30
7	'	'		$C_{14}H_{14}N_2O_2$	99~101	88	69.40 69.47	5.83 5.79	11.56 11.60
8	4-OMe	'		$C_{13}H_{12}N_2O_2$	131~132	79	68.41 68.35	5.30 5.26	12.27 12.31
9	'	'		$C_{14}H_{14}N_2O_2$	150~153	65	69.40 69.36	5.83 5.79	11.56 11.52
10	'	'		'	71~73	68	69.40 69.47	5.83 5.78	11.56 11.58
11	'	'		'	61~64	77	69.40 69.45	5.83 5.88	11.56 11.63
12	'	'		$C_{15}H_{16}N_2O_2$	136~137	82	70.29 70.37	6.29 6.34	10.93 10.89

13	2,3-(OMe) ₂	H		C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₃	117~118	58	65.10 65.14	5.46 5.49	10.85 10.91
14	'	'		C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₃	110~111	62	66.16 66.12	5.92 5.95	10.29 10.33
15	'	'		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃	111~112	67	67.11 67.14	6.34 6.37	9.78 9.75
16	2,4-(OMe) ₂	'		C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₃	98~99	51	66.16 66.11	5.92 5.87	10.29 10.34
17	'	'		'	140~141	69	66.16 66.21	5.92 5.96	10.29 10.31
18	'	'		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃	93~94	63	67.11 67.15	6.34 6.39	9.78 9.74
19	2,6-(OMe) ₂	'		C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₃	155~156	67	66.16 66.22	5.92 5.97	10.29 10.24
20	'	'		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃	206~209	63	67.11 67.07	6.34 6.39	9.78 9.80
21	3,4-(OMe) ₂	'		C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₃	84~86	79	65.10 65.16	5.46 5.41	10.85 10.87
22	'	'		'	49~51	88	65.10 65.08	5.46 5.43	10.85 10.88
23	'	'		C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₃	122~123	63	66.16 66.12	5.92 5.97	10.29 10.24
24	'	'		'	128~129	74	66.16 66.19	5.92 5.88	10.29 10.33
25	'	'		'	131~132	75	66.16 66.20	5.92 5.96	10.29 10.25

26	3,4-(OMe) ₂	H		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃	69~71	63	67.11 67.15	6.34 6.37	9.78 9.77
27	'	'	i-Pr	C ₁₂ H ₁₇ NO ₃	144~145	85	64.55 64.59	7.68 7.61	6.27 6.23
28	'	'	n-Bu	C ₁₃ H ₁₉ NO ₃	83~84	88	65.80 65.78	8.07 8.03	5.90 5.84
29	'	'	s-Bu	'	127~128	83	65.80 65.84	8.07 8.04	5.90 5.93
30	'	'	i-Bu	'	124~125	80	65.80 65.85	8.07 8.11	5.90 5.95
31	'	'		C ₁₅ H ₂₁ NO ₃	181~182	91	68.41 68.36	8.04 8.07	5.32 5.36
32	3,5-(OMe) ₂	'		C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₃	96~97	85	66.16 66.12	5.92 5.98	10.29 10.32
33	'	'		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃	119~120	87	67.11 67.18	6.34 6.37	9.78 9.72
34	3,4,5-(OMe) ₃	'		C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₄	154~156	65	62.49 62.53	5.59 5.64	9.72 9.71
35	'	'		'	157~158	77	62.49 62.52	5.59 5.56	9.72 9.73
36	'	'		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄	115~116	58	63.56 63.52	6.00 6.04	9.27 9.25
37	'	'		'	145~146	69	63.56 63.51	6.00 6.07	9.27 9.22
38	'	'		'	127~128	64	63.56 63.59	6.00 6.03	9.27 9.29

39	3,4,5-(OMe) ₃	H		C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O ₄	145~146	71	64.54 64.58	6.37 6.32	8.86 8.90
40	"	"	n-Pr	C ₁₉ H ₁₉ NO ₄	114~115	73	61.64 61.60	7.56 7.59	5.53 5.57
41	"	"	i-Pr	"	154~155	77	61.64 61.66	7.56 7.54	5.53 5.58
42	"	"	n-Bu	C ₁₄ H ₂₁ NO ₄	133~134	80	62.90 62.87	7.92 7.86	5.24 5.27
43	"	"	s-Bu	"	162~163	75	62.90 62.95	7.92 7.94	5.24 5.20
44	"	"	t-Bu	"	133~134	79	62.90 62.91	7.92 7.88	5.24 5.29
45	"	"	i-Bu	"	122~123	81	62.90 62.96	7.92 7.87	5.24 5.28
46	"	"		C ₁₆ H ₂₃ NO ₄	182~183	88	65.51 65.54	7.90 7.93	4.78 4.72
47	"	i-Pr	i-Pr	C ₁₆ H ₂₅ NO ₄	127~128	72	65.06 65.11	8.53 8.59	4.74 4.71

このようにして得られる本発明の化合物は、優れた血糖降下作用を有し、ヒトに対しては0.1~100mg/kgで有効で、1日1回0.1~100mg/kgの投与で24時間以上その効力を持続する。

投与に際しては、通常の製剤化に用いられる慣用手段により所望の剤型に成形された製剤が用いられる。

実施例 1.

1群5匹の5週令DDY系マウス(雄, 体重25~30g)を16時間絶食後、アロキサ75mg/kgを静脈内に投与し、48時間後に、本発明化合物(200mg/kg)の水溶液又はけん濁液を経口投与し、150分後に心臓から採血し、グルコースオキシダーゼ法により血中糖量を測定した。測定結果を表2に例示する。

なお、表中の化合物番号は、参考例の化合物番号に対応している。

表 2

投与化合物	血糖値 (mg/dl) mean ± S. D.
なし(対照)	47.3 ± 2.8
1	32.6 ± 4.2 **
3	37.8 ± 3.1 **
4	36.4 ± 1.9 ***
6	37.8 ± 5.2 *
7	41.2 ± 3.3 *
12	38.3 ± 2.8 **
17	34.5 ± 4.1 ***
22	37.8 ± 3.7 **
25	35.5 ± 4.6 **
26	33.6 ± 3.2 ***
27	40.7 ± 3.0 *
28	40.2 ± 2.4 **
29	42.1 ± 2.7 *
32	41.6 ± 2.3 *
33	40.2 ± 3.4 *
36	41.6 ± 2.1 **
38	30.7 ± 4.3 ***
39	41.2 ± 3.1 *
41	42.1 ± 2.8 *
46	38.3 ± 4.1 **

*: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001

実施例 2.

4 - メトキシ - N - 3 - ビリジール

ベンズアミド(化合物1) 100 部

リン酸水素カルシウム 58.5 部

結晶セルロース 50 部

コーンスターチ 40 部

ステアリ酸カルシウム 1.5 部

これらをよく混合し、常法により1錠250mg
に打錠(有効成分100mg含有)し、血糖降下用
錠剤として用いる。

出願人 中外製薬株式会社

代理人 安藤 憲 章



第1頁の続き

- ⑫発明者 小泉益男
東京都豊島区高田三丁目41番8
号中外製薬株式会社内
- ⑬発明者 村上泰
東京都豊島区高田三丁目41番8
号中外製薬株式会社内
- ⑭発明者 日野原好和
東京都豊島区高田三丁目41番8
号中外製薬株式会社内
- ⑮発明者 中野英樹
東京都豊島区高田三丁目41番8
号中外製薬株式会社内
- ⑯発明者 高垣善男
東京都豊島区高田三丁目41番8
号中外製薬株式会社内